



Grandes
Cultures

IMP-LIMOGES 94-001815
Avertissements
Agricoles
Auvergne

DLP IMP 2 3 - 8 - 94 0771 €

Bulletin technique N° 4 du 28/04/94

Supplément n° 1

COLZA
Charançons des Siliques : A surveiller.
Sclerotinia : Rappel.

BLE
Maladies : Peu d'évolution.
Surveiller Oïdium et Septoriose.

COLZA

Stades : Formation des Siliques G2 à G3.

CHARANÇONS DES SILIQUES

★ **Situation**

Les captures en cuvettes jaunes sont notées très localement depuis quelques jours (activité plus soutenue dès le 26/04) : SAINT-GERON (43), SAINT-BONNET-ES-ALLIER, LE BROCC (63).

★ **Préconisation**

Le Colza est sensible dès le stade G2 - G3 jusqu'à G4 (10 premières siliques bosselées).

Par beau temps, effectuer un contrôle en bordure du champ (à 10 m) : détecter les insectes sur le sommet des plantes.

Intervenir seulement si on observe au moins 1 Charançon pour 2 plantes.

Un traitement de bordure est très souvent suffisant dans notre région. Celui-ci limite aussi les attaques de Cécidomyies.

N.B.- La rémanence des insecticides autorisés n'excède pas 4 - 5 jours à ces stades du Colza.

Ne pas mélanger insecticide et fongicide.

MALADIES

Rappel pour la protection "Sclerotinia" (en fonction de la date du premier traitement et de la durée de floraison.

Publication mensuelle
Abonnement annuel : 230 Frs
Chèques : Régie de recette D. R. A. F.
Imprimerie D. R. A. F.

D.R.A.F. Service Régional
de la Protection des Végétaux
Marmilhat B.P. 45 - 63370 LEMPDES
Tél : 73. 42. 14. 83 - Fax : 73. 90. 83. 70

P-112

BLE

- Stades (1 noeud - 6
) 2 noeuds - 7
 (Début de sortie de la F1 (très localement).

MALADIES

★ Situation

Sur le feuillage : Encore peu d'évolution.

- SEPTORIOSE : Stagnation sur les feuilles basses ; plus fréquente dans l'Allier notamment en Sologne et Bocage sur les F4 visibles, mais encore rarement sur les F3.

- OIDIUM : Légère progression en situations favorables et sur variétés sensibles.

- ROUILLE BRUNE : Présence de quelques pustules très localement (situations précoces).

★ Préconisation

Visiter vos parcelles régulièrement.

Pour la Septoriose notamment, il faut agir dès le début du passage sur la F3 (il n'y a pas d'urgence pour l'instant).

Pour l'Oïdium, intervenir rapidement avec un fongicide adapté (Morpholines) en cas de "montée" significative.

ATTENTION : *Tenir compte aussi de la présence éventuelle de la Septoriose dans la parcelle pour le choix du fongicide.*

Consulter le dépliant vert SPV - ITCF.

IMPORTANT : LE RESPECT DES DOSES HOMOLOGUEES S'IMPOSE POUR BENEFICIER DE LA PLEINE EFFICACITE ET DE LA PERSISTANCE DU TRAITEMENT.

La fiche couleur "BLE : MALADIES DU FEUILLAGE" est à conserver.